Le risque de neutropénie

D'après le **département d'oncologie médicale du Centre Alexis-Vautrin, 54511 Vandœuvre-lès-Nancy**

La chimiothérapie que vous avez reçue peut entraîner des **effets secondaires,** qui doivent disparaître dans les quelques jours après l'arrêt du traitement.

CONSULTER SANS TARDER

Si les effets secondaires persistent, vous devez consulter votre médecin traitant sans tarder, en particulier si vous avez des **vomissements** qui persistent plus de 2 jours suivant votre sortie ou si vous **urinez moins que de coutume...**

De toute façon, il est souhaitable de revoir votre médecin traitant entre les hospitalisations, car il est informé de votre maladie et peut vous surveiller au mieux.

La réaction habituelle à la chimiothérapie est un retentissement sur la formule sanguine (globules blancs, plaquettes, globules rouges). Elle survient en général entre le 8e et le 15e jour après la cure de chimiothérapie.

En cas de fièvre ou de symptôme anormal, contacter impérativement votre médecin traitant pour qu'il vous prescrive une prise de sang (numération formule = NF avec plaquettes) plutôt que de téléphoner au centre où vous recevez la chimiothérapie.

À titre indicatif, en fonction du résultat, la conduite à tenir peut être la suivante :

	①	②
POLYNUCLÉAIRES NEUTROPHILES/mm³	**Inférieurs à 1 000**	**Inférieurs à 500**
PLAQUETTES/mm³	**Entre 50 000 et 80 000**	**Moins de 50 000**
CONDUITE À TENIR	**En cas de symptôme :** ➥ **contacter votre médecin traitant**	**Aucun symptôme :** ➥ **contacter votre médecin traitant** Rythme recommandé de surveillance des prises de sang : 1 jour sur 2
		En cas de symptôme : fièvre ; frissons ; diarrhée ; saignements (nez, gencives, autres...) ➥ **contacter votre médecin traitant** avant un éventuel retour dans le service qui vous suit pour votre cancer

UNE HOSPITALISATION EST NÉCESSAIRE

➥ Si le nombre de **plaquettes est inférieur à 20 000/mm³** ou s'il existe des **saignements** avec un nombre de **plaquettes inférieur à 50 000/mm³**.

➥ Si le nombre de **polynucléaires est inférieur à 500/mm³** avec une **fièvre supérieure à 38,5 °C** ou **supérieure à 38 °C deux fois de suite** en 3 heures.